

## **О заболеваемости и смертности населения Ярославской области от туберкулеза**

Заболеваемость населения Ярославской области активным туберкулезом за последние десять лет снизилась в 2.8 раза и составила в 2022 г. 16.1 заболеваний на 100 тысяч человек населения, что на 13.4 процента меньше, чем в 2021 г. (в абсолютных значениях 193 человека против 229).

У подавляющего большинства впервые зарегистрированных пациентов с туберкулезной инфекцией (95.9%) – туберкулез органов дыхания.

По данным областного туберкулезного диспансера, в 2022 г. у 31.6 процента пациентов с туберкулезом органов дыхания, взятых на учет, болезнь обнаружена в стадии распада.

Уровень заболеваемости активным туберкулезом среди сельских жителей выше на 12.1 процента, чем среди горожан (17.6 и 15.7 заболеваний соответственно на 100 тысяч человек населения), среди мужчин – в 2.9 раза выше, чем среди женщин. Неодинаков уровень заболеваемости и в различных возрастных группах. Наибольшая доля заболевших отмечается в возрасте с 35 до 44 лет: из 100 тысяч человек населения данного возраста заболели 33 человека.

Для своевременного выявления и лечения пациентов с диагнозом «Туберкулез» в области проводятся профилактические медицинские осмотры. В 2022 г. 50.6 процента заболевших выявлено при таких осмотрах.

В 2022 г. в области зафиксировано 25 случаев смерти от туберкулеза. Уровень смертности снизился за истекший год на 8.7 процента и составил 2.1 случая на 100 тысяч человек населения, что ниже показателя 2012 г. в 2.9 раза.

Удельный вес умерших от всех форм туберкулеза в общем количестве смертей составлял в течение последнего десятилетия всего 0.1–0.4 процента.

Подавляющее большинство случаев смерти связаны с туберкулезным поражением органов дыхания (80.0% – в 2022 г., 96.4% – в 2021 г.), туберкулезный процесс других органов и систем становился причиной смерти достаточно редко.

Коэффициент смертности населения от туберкулеза в сельской местности в 2022 г. превысил аналогичный показатель в городской местности на 30.0 процента и составил 2.6 в расчете на 100 тысяч человек населения против 2.0 в городских поселениях.

Смертность среди мужского населения от всех форм туберкулеза незначительно превышает женскую. Так в прошедшем году от туберкулеза умерло 15 мужчин и 10 женщин.

Наиболее высокий уровень смертности от туберкулеза в прошедшем году зафиксирован в Мышкинском, Большесельском, Некоузском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском муниципальных районах – в расчете на 100 тысяч человек населения он превышал показатель по области соответственно в 5.2 – 2.0 раза.

В Брейтовском, Даниловском, Любимском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском, Рыбинском, Тутаевском муниципальных районах случаев смерти от туберкулеза не зафиксировано. В Ростовском и Ярославском муниципальных районах в 2022 г. коэффициент смертности населения от туберкулеза был ниже, чем в целом по области, и составил 1.7 и 1.4 случая смерти на 100 тысяч человек населения соответственно.